



Detail produktu

Brodisan Blue PF voskové bloky k hubení hlodavců, 140 g

Rodenticidní přípravek ve formě voskových bloků pro použití uvnitř a v blízkém okolí budov k regulaci výskytu potkanů. Přípravek obsahuje hořké ochucovadlo, které snižuje riziko konzumace dětmi a domácími zvířaty. Rodenticidní přípravek ve formě voskových bloků pro použití širokou veřejností a profesionálními uživateli, uvnitř a v blízkém okolí budov k regulaci výskytu potkanů.

Dávkování:

- Potkani: 100-200 g nástrahy na jednu deratizační staničku.
- Myši 20-40 g nástrahy na jednu deratizační staničku.

Pokud je potřebné mít více deratizačních staniček, měly by být od sebe vzdáleny minimálně 5m. Nástraha by neměla být používána jako trvalá za účelem prevence zamoření nebo sledování aktivity hlodavců.

Návod k použití:

Široká veřejnost by před použitím přípravku měla zvážit, zda by nebylo pro dosažení požadovaného účinku dostatečně použití mechanických pastí nebo jiných nechemických metod. V nezbytném případě by měl přípravek být aplikován v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření, které jsou umístěny mimo dosah dětí, ptáků, domácích a hospodářských zvířat a jiných necílových organismů, v blízkosti míst očekávaného výskytu hlodavců. Pokud je to možné, měly by být staničky zajištěny připevněním k zemi nebo pevných bodům proti odtahování. Před aplikací přípravku by měly být z ošetřených prostor odstraněny všechny potraviny a krmiva. Staničky by měly být označeny výstražnými informacemi Nepřemísťujte a neotvírejte. Obsahuje přípravek na hubení hlodavců Brodisan Blue MM s úč. látkou brodifakum. V případě nehody volejte Toxikologické informační středisko. Při manipulaci s přípravkem používejte ochranné rukavice, nejezte, nepijte, nekuřte. Po ukončení činnosti si umyjte ruce a případně znečištěnou kůži mýdlem a vodou. Deratizační staničky je nutné kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů od zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, deratizační staničky jsou neporušené a za účelem sběru uhynulých hlodavců. V případě potřeby nástrahu doplnit. Znečištěnou nebo znehodnocenou návnadu odstranit. Pokud během 35 dnů od zahájení deratizace nedojde k potlačení výskytu hlodavců, vyžádejte si radu od dodavatele přípravku nebo se obraťte na deratizační službu. Přípravek a hlodavci intoxikováni přípravkem mohou být nebezpeční pro děti, necílová zvířata a ptáky.

Varování:

Přípravek obsahuje antikoagulační látku. Po jeho požití může dojít, a to i se zpožděním, ke krvácení z nosu a dásní, ke krevním výronům a k vnitřnímu krvácení s výskytem krve v moči a stolici. Při znečištění kůže je potřebné omýt zasažené místo mýdlem a vodou. Při zasažení očí vyplachovat oči nejméně po dobu 10min. vodou. Při požití vyhledat co nejdříve lékařskou pomoc, v případě necílových zvířat veterinární pomoc. Zdravotnický nebo veterinární personál může jako antidotum podat vitamín K1.

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

EAN:	8594015800189
Obj. číslo:	678172
Výrobce:	Tekro
Značka:	Brodisan
Hmotnost	0,2 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/brodisan-blue-pf-voskove-bloky-k-hubeni-hlodavcu-140-g