



Detail produktu

Ratimor Brodifacoum parafinové bloky nástraha na hlodavce, 300 g

Extrudované parafinové kostky s tvarovanými okraji, které umožňují hlodavcům okusování. Jsou výjimečně účinné, i když jsou vystaveny vlhkosti nebo vysokým teplotám.

Klíčové vlastnosti Ratimor Brodifacoum nástraha na hlodavce:

- Vysoká účinnost již při malém množství (při jediné konzumaci),
- vysoká odolnost proti vlivům okolí (zvláště vhodné pro vlhká místa a venkovní použití),
- obsahuje konzervant, který zabráňuje plesnivění a chrání návnadu před bakteriemi a houbami,
- zpožděný účinek, který dodatečně zvyšuje účinnost nástrahy,
- obsahuje hořký averzivní prostředek.

Použití Ratimor parafinové bloky na hlodavce:

Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi. Před použitím rodenticidů je třeba zvážit nechemické metody regulace (např. pasti). Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (např. rozsypané zrní nebo potravinový odpad). Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před zahájením deratizace nečistěte, neboť to populaci hlodavců jen vyruší a ztěžuje to akceptaci nástrahy. Deratizační staničky je třeba umístit v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců (např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory atd.). Pokud je to možné, musí být deratizační staničky připevněny k zemi nebo k jiným konstrukcím. Umístěte deratizační staničky mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat.

Neumísťujte deratizační staničky v blízkosti potravin, nápojů a krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu.

Neumísťujte deratizační staničky v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku. Na konci období deratizace odstraňte zbývající nástrahu nebo deratizační staničky. Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.

Nepoužívejte přípravek jako stálou nástrahu k prevenci zamoření hlodavci nebo sledování aktivity hlodavců. Určeno k použití pouze v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření. Označujte deratizační staničky v souladu s doporučeními uvedenými u přípravku. Při použití tohoto přípravku by mělo dojít k vyhubení hlodavců do 35 dnů. Aby si uživatel v případě, že má na konci deratizace podezření na nedostatečnou účinnost přípravku (tj. pokud stále pozoruje aktivitu hlodavců), vyžádal radu dodavatele přípravku nebo se obrátil na deratizační službu. V průběhu deratizace vyhledávejte a odstraňujte uhynulé hlodavce, a to nejméně se stejnou frekvencí, s jakou kontrolujete deratizační staničky. Uhynulé hlodavce likvidujte jako nebezpečný odpad předáním do spalovny s osvědčením opravňujícím k likvidaci nebezpečného odpadu.

Způsob aplikace Ratimor nástraha na hlodavce:

Nástraha k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

Ve vnitřních prostorách (Potkan obecný a Krysa obecná):

10 g - 60 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů, s výjimkou snížení na 5 metrů při vysoké míře zamoření. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu. Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou trvalé a pulzní aplikace nástrahy.

Venkovní prostory kolem budov (Potkan obecný a Krysa obecná):

10 g - 60 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů, s výjimkou snížení na 5 metrů při vysoké míře zamoření. Umístěte deratizační staničky v prostorech, kde nehrozí záplavy. Vyměňte nástrahu v deratizační staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu. Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou trvalé a pulzní aplikace nástrahy.

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

EAN:	3830050607945
Obj. číslo:	678203
Výrobce:	Unichem
Značka:	Ratimor
Hmotnost	0,3 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/ratimor-brodifacoum-parafinove-bloky-nastraha-na-hlodavce-300-g